

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Sorgo 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Diserbo letti di semina.					
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen		Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, soia ,					
		Pendimethalin							
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina		In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile massimo una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.					
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Mesotrione							
	Dicotiledoni	Pyridate							
		Bentazone		Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su sorgo , erba medica o soia.					
		2,4 D				Allo stadio di 4 - 6 foglie.			
		Dicamba							
		MCPA			Allo stadio di 4 - 6 foglie.				

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

		<b>Prosulfuron</b>		Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.					
		Fluroxipir							